Hiperplasia interdigital de membros posteriores em vaca

Ellen Herliny da Silva Rodrigues de Faria¹, Keny Kerly Rodrigues de Oliveira¹, Karolyne Rodrigues de Souza¹, Carla Marques dos Santos¹, Erick Cazusa dos Anjos Gomes¹, Yasmin Adorno de Souza¹, Victor Gabriel Silveira de Souza¹ e Josiane Clarindo de Freitas²

Discentes¹ e Docente² do curso de Medicina Veterinária, Centro Universitário Afya de Jiparaná. *Autor correspondente: josiane.clarindo@saolucasjiparana.edu.br

Introdução: A hiperplasia interdigital, também denominada tiloma ou gabarro, é uma enfermidade caracterizada pela proliferação anômala de tecido conjuntivo na região interdigital de bovinos. Essa condição pode comprometer significativamente a locomoção dos animais, afetando seu bem-estar e desempenho produtivo, tanto na pecuária leiteira quanto de corte. Diante dos prejuízos zootécnicos e sanitários associados, é essencial o diagnóstico precoce e a adoção de medidas terapêuticas adequadas. **Objetivo:** Relatar o manejo cirúrgico de um caso de hiperplasia interdigital em uma vaca mestiça prenhe, evidenciando os principais aspectos do procedimento, bem como a evolução clínica do animal. **Metodologia:** O atendimento ocorreu em uma propriedade rural no município de Vale do Paraíso (RO). A paciente, uma vaca mestiça em início de gestação, apresentava hiperplasia interdigital em ambos os membros posteriores. O protocolo incluiu sedação com Cloridrato de Xilazina 2%, anestesia local com Lidocaína 2%, higienização criteriosa e excisão cirúrgica do tecido hiperplásico. No membro mais comprometido (posterior direito), realizou-se cauterização para hemostasia, devido ao volume exacerbado do tecido. Após a remoção, aplicou-se curativo tópico com medicação e bandagem, além de administração intramuscular de antibiótico e analgésico. **Resultados:** O tratamento pós-operatório incluiu antibioticoterapia sistêmica, cuidados locais diários e monitoramento contínuo da cicatrização. A resposta clínica foi satisfatória, com progressiva recuperação locomotora, ausência de infecção e boa evolução da ferida cirúrgica. **Considerações Finais:** A intervenção cirúrgica mostrou-se eficaz no controle da hiperplasia interdigital, proporcionando melhora clínica e funcional ao animal. O caso reforça a relevância da identificação precoce e do tratamento adequado, sobretudo em vacas gestantes, visando preservar a saúde e o desempenho produtivo dos bovinos.

Palavras-chaves: Bem-estar animal, Cirurgia em bovinos, Hiperplasia interdigital.