

16. 17 e 18
de **Outubro**

10° Fórum Rondoniense de Pesquisa



SÃO LUCAS | Afya
JI - PARANÁ - RO

Malária no Brasil: Análise da morbimortalidade e internações hospitalares (2021-2023)

Maria Isabel Rosa Teixeira^{1*}, Juliana Rosa Teixeira², Caren Manuella Rosa Teixeira³ e Nilza Rosa Teixeira⁴

¹Acadêmica do Curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica-PUC Curitiba, PR, Brasil. *E-mail: isabelrosat18@gmail.com.

²Médica formada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná-Unioeste, Cascavel, PR, Brasil. Email: julianarosateieira@hotmail.com.

³Acadêmica do curso de Medicina Veterinária da Universidade Mauricio de Nassau-Unassau, Cacoal-RO, Brasil. Email: manuh.bio2012@gmail.com.

⁴Mestre em Psicologia e Acadêmica do Curso de Medicina do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – JPR, Ji-Paraná, RO, Brasil. *Email: nilzarosa@hotmail.com.

Introdução: A malária, doença endêmica em diversas regiões do mundo, representa um importante problema de saúde pública. A transmissão vetorial e a vulnerabilidade de determinados grupos populacionais exigem ações eficazes de prevenção e controle. **Objetivo:** Estudar a morbimortalidade por malária e a prevalência nas internações hospitalares na rede pública de saúde brasileira entre os anos de 2021 e 2023. **Metodologia:** Estudo retrospectivo, descritivo e quantitativo, com utilização de dados secundários (SIH/SUS) DATASUS, pertencentes aos casos de internação por malária entre 2021 e 2023. Variáveis utilizadas região/unidade federação, sexo, idade, cor/etnia, custos e óbitos, com exclusão de nos critérios estabelecidos. **Resultados:** No período analisado houve o registro de 5963 internações por malária, distribuídos pelas regiões: Norte (n= 4741), Centro Oeste (n= 514), Nordeste(n=377), Sudeste(n=223) e Sul (n=108) casos, sendo que dessas internações totais ocorreram 60 óbitos. Conforme perfil populacional a região Norte apresentou o maior percentual(n=2,53%), com aumento crescente a partir de 2021. A média de permanência foi de 4,7 dias, com valor de R\$2.236.948,54 em serviços hospitalares. A faixa etária mais acometida indivíduos entre 20-24 anos, sexo masculino(n=58,04%) e da cor parda(n=64,65%) dos casos. **Conclusão:** A análise evidencia alta prevalência de internações por esta patologia na rede pública saúde, com predominância na Região Norte e com maior impacto em homens entre 20-24 anos e da cor parda. Diante desse cenário, torna-se urgente a implementação de estratégias eficazes de prevenção e controle, com ênfase na educação em saúde, imunização e melhoria do acesso aos serviços de saúde nas áreas mais vulneráveis

Palavras-Chave: Brasil. Malária. Sistemas de Saúde.